

درس‌های عفونت شه

این عفونت به بافت نرم اطراف دندان آسیب می‌رساند و می‌تواند باعث درد دندان، ورم صورت، گوش درد و حتی لق شدن دندان‌ها شود



پزشکی

عفونت لثه که به آن بیماری لثه هم می گویند، نوعی عفونت جدی لثه است که به بافت نرم اطراف دندان ها آسیب می رساند. عفونت لثه اگر در مان نشود، می تواند استخوان نگهدارنده دندان ها را از بین ببرد. در نتیجه، دندان ها لق می شوند یا می افتند. این عفونت باعث ایجاد تورم، قرمزی و خونریزی در لثه ها و در صورت در مان نشدن، منجر به از بین رفتن استخوان و بافت نگهدارنده دندان ها خواهد شد. علایم این بیماری شامل تورم و قرمزی لثه، خونریزی لثه حین مسواک زدن یا خوردن غذا، بوی بد دهان، تغییر در شکل و ظاهر لثه، لق و شل شدن دندان ها و در نوار احتی در محل لثه است؛ برای آن که در مواجهه با این بیماری ابتکار عمل بهتری داشته باشید در این مطلب به نقل از (doctoreto.com) بیشتر با آن آشنا می شویم.

شکی

علايم عفونت لته

علايم پيږودنتيت عبارتند از: تورم و قرمزی لثه، خونريزی به خصوص هنگام مسواک کردن يا خوردن غذا، بوی بد و نامطبوع در دهان، تغيير شکل و ظاهر لثه، تورم لثه ها، لق و شل شدن دندان ها.

پیامدهای عفونت لته

در دندان درد در ناحیه دندان می تواند
 ناشی از عواملی مانند پوسیدگی،
 شکستگی، حساسیت دندان یا التهاب پالپ
 (عصب داخل دندان) باشد و بر طبق به عفونت
 لته نداشته باشد. اما در برخی موارد، عفونت
 لته می تواند باعث التهاب و درد در ناحیه دندان

نیز شود.

۲۹

۲ ورم صورت در برخی موارد، عفونت داخل دندان ها و استخوان های فک نفوذ می کند و سبب ایجاد آبسه در این نواحی می شود. آبسه های ایجاد شده در داخل استخوان فک باعث ورم و التهاب در ناحیه صورت خواهند شد که معمولاً با درد شدید، قرمزی و حساسیت به لمس همراه است.

350

۳ گوش در دل لثه و فک نزدیک به ناحیه گوش قرار دارند. بنابراین، عفونت و التهاب در ناحیه لثه می تواند به راحتی به گوش نیز سرایت کند. عفونت لثه می تواند باعث التهاب و عفونت در ناحیه گوش شود و به شکل

یوست و مو

افزایش سن به تغییرات فیزیکی اجتناب ناپذیری منجر می شود که ممکن است همیشه خوشایند نباشد، مخصوصاً درباره موها. با کاهش سطح هورمون هایی مانند استروژن و پروژسترون پس از ۴۰ سالگی، ممکن است بارش مو، شکنندگی و خشکی آن ها مواجه شوید. تغییرات هورمونی ممکن است به خارش کف شدن مو و افزایش ریزش آن ها نیز منجر شود. برای مقابله با این مشکلات، عاید بر نامه مناسب مرقبت از مو مناسب این سن اهمیت بسیار دارد. به موا

ها

مراقبت از موبعد از ۴۰ سالگی

ن استایل» در مقاله‌ای به جزئیات این برنامه مراقبتی داخه است که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانیم. **سالیکی** با ورود به دهه چهلیم گی، کاهش تدریجی استروژن و پرپوستون آغاز می‌شود. به تغییرات مختلفی، از جمله نامنظم شدن قاعدگی و بیبر موه منجر می‌شود. کاهش سطح استروژن ممکن باعث از بین بردن کلاژن و افزایش ریزش آن شود. هکارهایی برای حفظ سلامت موی با افزایش

۴ **سر در** این بیماری نوعی التهاب مزمن در دهان است که باعث تحریک شروع می‌گردد. انتشار مواد التهابی در فرد مبتلا به عفونت لثه، روی عروق خونی و عصب‌های داخل سر و ناحیه گردن تأثیر می‌گذارد و باعث ایجاد سر در می‌شود. واکنش لثه‌ها را می‌توان به این شکل توضیح داد: ابتدا سر در در افزایش دهد.

لقد شددت دندان | این بیماری، به تخریب

تدریجی بافت‌های نگه‌دارنده دندان از جمله لثه و استخوان فکی می‌انجامد.

خونریزی | التهاب و تورم شدید لثه در اثر

عقونت، سبب ضعیف شدن دیوار ههای عروقی در لته می شود، در نتیجه، حین مسواک دین باغذا خوردن، احتمال خونریزی خواهد بود. در برخی موارد که عقونت لته ناشی از ضعف سیستم ایمنی فرد باشد، سیستم ایمنی ضعیف می تواند به خوبی عقونت را کنترل کند و در نتیجه، التهاب و خون آمدن لته تشدید می شود.

بوی بد دهان| این بیماری یک علت بوی

بدهان است که می‌تواند برای بیمار زار دهنده باشد. بوی بدهان نشانه شدت بیماری است که بوی شبیه عفونت زید، گوگرد

این بیماری از عوامل مختلفی ایجاد می شود که عبارتند از: تجمع پلاک باکتریایی روی سطح دندان ها و لثه، عفونت لثه در افراد دارای ضعف سیستم ایمنی مانند بیماران دیابتی یا مبتلایان به ایدز، عوامل ژنتیکی، برخی بیماری ها مانند سرطان، درمان های شیمیایی و رادیوتراپی، عوامل محیطی و رفتاری مانند استرس، سیگار کشیدن و تغذیه نامناسب و عفونت لثه در کودکان. از این بیماری می توان پیشگیری کرد. اگرچه این بیماری در کودکان کمتر دیده می شود، علت اصلی این بیماری در کودکان که تجمع پلاک روی دندان ها است، کودکان معمولاً بیشتر به ورم التهاب لثه مبتلا می شوند که خفیف ترین حالت پرودنتیت است.

معدل بیشترین تاثیر را در سالم نگه داشتن ویتامین ها و مواد معدنی کافی، به همراه سب از پوست سرو مو، به حفظ سلامت موها

ی حالت دهی به موهای مسن | استفاده

و محصولات مراقبتی سنگین و تمرکز بر حجم دهنده و ضخیم کننده به حفظ حجم بد.

که ویتامین D مصرف می کردند، ۹ درصد کمتر از افرادی است که دارونما مصرف

نیل [بی] یا در مان عروق مسدود شده در قلب پیدا نکردیم.»



ویتامینی که از مادر برابر حمله قلبی مراقبت می کند

[illegible]